

AMALGEROL



Düngertyp: PFC 6(B): NICHT-MIKROBIELLES PFLANZEN-BIOSTIMULANS

Physikalische Form: Flüssig

Inhaltsstoffe über 5% des Produktgewichts:

Mineralöl¹ (CAS-Nr. nicht verfügbar [EC-Nr. 919-857-5] und 64742-95-6), Ascophyllum nodosum Algenextrakt¹ (CAS-Nr. 84775-78-0), Polyglycolester¹ (CAS-Nr. nicht verfügbar).

Zusätzliche Inhaltsstoffe:

Ätherische Öle¹, Pflanzenextrakte¹.

¹CMC 1: Stoffe und Gemische aus unbearbeiteten Rohstoffen

Hersteller und Inverkehrbringer: Hechenbichler GmbH

Cusanusweg 7-9, A-6020 Innsbruck

Tel: +43 512 291810-0; Fax: -23; E-mail: office@amalgerol.com; www.amalgerol.com

ALLGEMEINE ANGABEN

AMALGEROL ist ein nicht-mikrobielles Pflanzen-Biostimulans für Landwirtschaft und Gartenbau.

ALLGEMEINE GEBRAUCHSHINWEISE

Allgemeine Aufwandmenge für Boden- und Blattanwendungen: 2 bis 5 l/ha pro Anwendung. Für bestimmte Kulturen und Anwendungsmethoden werden andere Aufwandmengen empfohlen. Anwendungshäufigkeit wie unten angegeben; zusätzliche Anwendungen sind alle **10 - 14 Tage** möglich.

Wassermenge: Verwenden Sie eine ausreichende Wassermenge, um eine vollständige Benetzung von Boden und Laub zu gewährleisten.

Bodenanwendung: AMALGEROL kann Kulturen im Rahmen von Bodenbehandlungen durch direktes Aufsprühen auf den Boden, über das Bewässerungssystem oder während der Aussaat zugeführt werden. TROPFENBEWÄSSERUNG/FERTIGATION: 10 bis 15 l pro Saison, aufgeteilt auf den Bewässerungsplan.

Blattanwendung: AMALGEROL kann Kulturen während des gesamten Vegetationszyklus durch Blattbehandlung zugeführt werden. Anwendungen werden in den wichtigsten Wachstumsphasen empfohlen, insbesondere zu Beginn des Erntezyklus, während der Blüte und Fruchtansatzphase.

GEBRAUCHSANWEISUNGEN

Kulturpflanzen	Aufwandmengen	Anwendungsmethode	Anwendungsphase	Anwendungshäufigkeit	Auslobung
Großflächenkulturen	5 l/ha	Blatt-spray	Während der gesamten Vegetationsperiode	1 bis 3	Verbessertes Qualitätsmerkmal: Erhöhter Ertrag

ZUSÄTZLICHE ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

FELDKULTUREN

ALLE FELDKULTUREN: Vor der Kultivierung oder Bodenbearbeitung: In die Saatfurche ausbringen oder unmittelbar vor der Saatbettbereitung aufsprühen und einarbeiten. Nach der Ernte: Im Herbst auf Ernterückstände aufbringen und sanft einarbeiten.

Getreide (Gerste, Hafer, Reis, Roggen, Triticale, Weizen, andere Getreidesorten): 1 bis 3 Anwendungen während des gesamten Vegetationszyklus.

Mais (Futtermittel, Getreide, Silage): 1 bis 3 Anwendungen während des gesamten Vegetationszyklus.

Ölsaaten (Leinsamen, Mohn, Raps, Sesam, Sonnenblumen usw.): 1 bis 3 Anwendungen während des gesamten Vegetationszyklus.

Kartoffeln und andere Knollengewächse: 1 bis 3 Anwendungen während des gesamten Vegetationszyklus.

Zuckerrüben: 1 bis 3 Anwendungen während des gesamten Vegetationszyklus.

Faserpflanzen (Baumwolle, Flachs, Hanf usw.): 1 bis 3 Anwendungen während des gesamten Vegetationszyklus.

Hülsenfrüchte (Bohne, Erbse, Kichererbse, Linse, Lupine, Sojabohne):

1 bis 3 Anwendungen während des gesamten Vegetationszyklus.

Tabak: 1 bis 3 Anwendungen während des gesamten Vegetationszyklus.

GEMÜSE

ALLE GEMÜSESORTEN: Vor der Kultivierung oder Bodenbearbeitung: In die Saatfurche ausbringen oder unmittelbar vor der Saatbettbereitung aufsprühen und einarbeiten. Nach der Ernte: Im Herbst auf Ernterückstände aufbringen und sanft einarbeiten.

Blattgemüse (Artischocken, Blumenkohl, Brokkoli, Chicorée, Kohl, Kopfsalat, Spargel, Spinat usw.): 1 bis 3 Anwendungen während des gesamten Vegetationszyklus. Im Falle von Umpflanzung erste Anwendung eine Woche nach dem Umpflanzen.

Fruchttragende Gemüsesorten (Auberginen, Chili, Gurken, Kürbis, Okra, Paprika, Tomaten usw.): 1 bis 3 Anwendungen während des gesamten Vegetationszyklus. Im Falle von Umpflanzung erste Anwendung eine Woche nach dem Umpflanzen.

Wurzel-, Zwiebel- oder Knollengewächse (Lauch, Karotten, Knoblauch, Rüben, Zwiebeln usw.): 1 bis 3 Anwendungen während des gesamten Vegetationszyklus. Im Falle von Umpflanzung erste Anwendung eine Woche nach dem Umpflanzen.

OBST & NÜSSE

ALLE OBST- UND NUSSSORTEN: Bis zu 10 l/ha für Bodenanwendungen im Frühjahr für Obstbäume und Weinreben.

Tropische und subtropische Früchte (Avocado, Banane, Dattel, Feige, Mango usw.): 1 bis 5 Anwendungen während des gesamten Vegetationszyklus.

Zitrusfrüchte (Grapefruit, Mandarine, Orange, Zitrone usw.): 1 bis 5 Anwendungen während des gesamten Vegetationszyklus.

Weinrebe: 1 bis 5 Anwendungen während des gesamten Vegetationszyklus.

Beeren (Erdbeere, Heidelbeere, Himbeere, Johannisbeere, Kiwi, Preiselbeere, Stachelbeere usw.): 1 bis 5 Anwendungen während des gesamten Vegetationszyklus.

10 l (9,7 kg)

Kern- und Steinobst (Apfel, Aprikose, Birne, Kirsche, Pflaume, Sauerkirsche usw.): 1 bis 5 Anwendungen während des gesamten Vegetationszyklus.

Nüsse (Haselnuss, Kastanie, Mandel, Pistazie, Walnuss usw.): 1 bis 5 Anwendungen während des gesamten Vegetationszyklus.

Olive: 1 bis 5 Anwendungen während des gesamten Vegetationszyklus.

ZIERPFLANZEN

Einjährige Pflanzen: 1 bis 5 Anwendungen während des gesamten Vegetationszyklus. Im Falle von Umpflanzung erste Anwendung eine Woche nach dem Umpflanzen.

Mehnjährige Pflanzen (Kräuter, Sträucher & Bäume): 1 bis 5 Anwendungen während des gesamten Vegetationszyklus.

ANWENDUNG VOR DEM UMPFLANZEN

Pflanzen vor dem Umpflanzen 10 Minuten lang in eine 1 %ige Arbeitslösung eintauchen oder vor dem Umpflanzen auf die Reihe sprühen.

RASEN

Dosiermengen und Anwendungszeitpunkte

0,75 bis 1,5 l pro 1000 m² AMALGEROL pro Anwendung in mindestens 100 l Wasser pro 1000 m² (entspricht 7,5 - 15 l/ha AMALGEROL pro Anwendung in mindestens 1000 l Wasser pro ha).

Ausbringung mittels Sprühbewässerung oder Sprühen.

Nach der Anwendung von AMALGEROL wird eine Bewässerung empfohlen, um die Durchdringung der Wurzelzone mit AMALGEROL sicherzustellen.

Typische Anwendungen

Bestehender Rasen: 2 bis 3 Tage nach einem Schnitt, Behandlung alle 4 bis 6 Wochen wiederholen (5 bis 10 Anwendungen pro Jahr).

Neuer Rollrasen: Direkt nach dem Verlegen der Rasensoden.

Neuansaat: Nach der Aussaat oder dem Auflaufen.

HOBBY-GARTENBAU

Zeitpunkt der Anwendung: Während der Vegetationsperiode im Abstand von 1 bis 2 Wochen.

Dosiermenge der Gebrauchslösung: 10 ml AMALGEROL auf 1 l Wasser. Die zubereitete Düngertlösung innerhalb eines Tages vollständig aufbrauchen.

Art der Anwendung

Ausbringung in den Boden mit Bewässerung (Gießkanne): 1 l Düngertlösung pro m² ausbringen.

Blattdüngung durch Sprühen (Sprühflasche oder Gartenspritze).

Anwendung vor der Verpflanzung: Pflanzen vor der Verpflanzung für 10 Minuten in die Arbeitslösung eintauchen.

MISCHANLEITUNG

Den Behälter vor dem Öffnen und Gebrauch gut schütteln! Großgebinde aufrühren!

Den Tank halb mit Wasser füllen, Mixer einschalten. Zuerst AMALGEROL unter ständigem Rühren hinzufügen, dann andere Produkte und restliches Wasser zugeben. Während des gesamten Spritzvorgangs rühren. Schutzbrille tragen. Spritz-/Sprühnebel nicht einatmen! Geräte nach Gebrauch gemäß den Anweisungen reinigen. Morgens oder abends sprühen. Lassen Sie die vorbereitete Sprühlösung nicht über längere Zeit (z.B. Pausen oder über Nacht) im Sprüherat. Nicht bei ungünstigen Witterungsbedingungen wie extremen Temperaturen, hohen Windgeschwindigkeiten, starken Lichtverhältnissen oder Starkregen anwenden. Sprühanwendungen sind nur empfohlen, wenn die Wachsschicht intakt ist.

Verträglichkeit: AMALGEROL ist mit den meisten Pflanzenschutzmitteln und anderen Produkten kompatibel. Bei der Verwendung mehrerer Produkte im Spritztank kann es jedoch zu Wechselwirkungen kommen. Misch- und Verträglichkeitstests durchführen, bevor AMALGEROL mit Pflanzenschutzmitteln, Düngemitteln oder anderen Produkten kombiniert wird. Die Gebrauchsanleitungen aller verwendeten Produkte sind zu befolgen.

HINWEISE ZUR HANDHABUNG

Gefahrenhinweis:

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise:

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

P260 Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Haut- und Augenkontakt sowie das Einatmen und Verschlucken vermeiden. Während der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Gebrauch Hände waschen. Schutzbrille und Schutzkleidung tragen. Bei Augenkontakt: Sofort über einen längeren Zeitraum mit reichlich Wasser spülen und dabei die Augenlider weit geöffnet halten. Beim Einatmen: Frischluft zuführen. Bei Verschlucken: Mund ausspülen, reichlich Wasser nachtrinken, kein Erbrechen hervorrufen. Bei Beschwerden ärztliche Hilfe konsultieren und Etikett oder Sicherheitsdatenblatt vorweisen.

Lagerung: Originalverpackt trocken in gut belüfteten Räumen zwischen +5 °C und +25 °C lagern. Vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Verpackung dicht verschlossen halten. Getrennt von Lebensmitteln und Futtermitteln lagern. Für Kinder und Haustiere unerreikbaar aufbewahren!

Halbbarkeit: Bei sachgerechter Lagerung ist AMALGEROL mindestens 18 Monate ab Produktionsdatum verwendbar (siehe Aufdruck).

Chargennummer: Siehe Aufdruck.

Produktionsdatum: Siehe Aufdruck.

Verfalldatum: 18 Monate ab Produktionsdatum (siehe Aufdruck).

Entsorgung: Nach Möglichkeit verbrauchen. Unverwertbare Reste entsprechend den geltenden örtlichen und nationalen Bestimmungen entsorgen. Verpackungen gründlich restentleert in den dafür vorgesehenen Sammelstellen entsorgen.



HECHENBICHLER
STÄRKT BODEN, PFLANZE, TIER

